

UDHËZIME PËR PRINDËRIT PËR NJË FËMIJË QË KA PASUR KONVULSIONE NGA TEMPERATURA

Të nderuar prindër!

Fëmija juaj ka pasur konvulsione nga temperatura. Konvulsionet afatshkurtra nga temperatura nuk janë të rrezikshme për fëmijën dhe nuk kanë pasoja për shëndetin e tij. Ato shfaqen midis moshës një vjeç dhe pesë vjeç dhe mund të përsëriten kur temperatura e trupit të rritet **PËRSËRI**.

Ne ju paraqesim masat për të reduktuar mundësinë e përsëritjes ose për të parandaluar konvulsionet nga nxehtësia.

Nëse fëmija juaj sëmuret me një temperaturë mbi 38,5°C, filloni menjëherë ta FTOHNI atë:

- fëmija duhet të jetë i veshur ose i mbuluar sa më pak të jetë e mundur;
- lajeni me ujë të vakët;
- të konsumojë pije të ftohta;
- jepini atij një nga barnat për të ulur temperaturën e trupit - Calpol®, Paracetamol®, Ibuprofen®, Brufen®, Lekadol®, Voltaren®...

Nëse konvulsionet përsëriten dhe zgjasin MË SHUMË SE 3 MINUTA, përdorni ilaçin e përshkruar nga mjeku juaj.

APLIKIMI I BARNAVE STESOLID ose DIAZEPAM:



© AboutKidsHealth.ca

1. Vendoseni fëmijën anash me gjunjë të përkulur.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

2. Hiqeni kapakun nga tubi dhe lyejeni majën me vaj ftohës ose vazelinë.
3. Më pas futeni me kujdes tubin në anusin e fëmijës dhe shtyjeni deri në fund të aksesorit.
4. Shtrydhni përmbajtjen e tubit rektal dhe pastaj tërhiqeni atë. Shtrydhni tubin gjatë heqjes për të parandaluar që bari të kthehet në aplikues.
5. Shtrëngojini të pasmet e fëmijës për pak kohë për të mos lejuar që bari të rrjedhë jashtë.

Nëse konvulsionet nuk ndalen brenda 5 minutave, përsërisni procedurën.

APLIKIMI I BARNAVE EPISTATUS ose MIDAZOLAM



1. Vendoseni fëmijën në pozicionin anësor.



2. Hapni buzët e fëmijës dhe futeni majën e shiringës matëse në zgavrën bucale (hapësira në gojë midis dhëmbëve dhe mishrave të poshtme).

3. Bari injektohet ngadalë deri në sasinë e përshkruar.

4. Hiqni shiringën matëse dhe shtrëngoni lehtë buzët e fëmijës në mënyrë që bari të mos dalë nga goja.

Bari Epistatus® ose Midazolam® është një qetësues që relakson muskujt dhe shkakton përgjumje. **Është e rëndësishme që fëmija të monitorohet nga afër pas dhënies së barit. Rekomandohet që të qëndroni me të për të paktën gjysmë ore derisa të shërohet plotësisht.**

Reparti i Pediatriisë
Kodi i katalogut: POo-05
Tetor 2023, versioni 1