

Funkcionalna endoskopska kirurgija obnosnih votlin - FESS

Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPERACIJA

FESS je operativni poseg, pri katerem izboljšamo prehodnost nosu in omogočimo zračenje obnosnih votlin. Pred posegom običajno predpišemo petdnevno zdravljenje z zdravili, ki zmanjšajo vnetje, kirurgu omogočijo lažji dostop ter boljšo preglednost pri posegu (če imate sladkorno bolezen ali želodčno razjedo, o tem opozorite zdravnika).

FESS opravljamo v splošni anesteziji endoskopsko skozi nosnici. Poseg povprečno traja 60–120 minut. Po posegu nosnici zamašimo z nosno tamponado za 24–48 ur. Dobili boste protibolečinska zdravila ter kasneje kapljice v nos. Lahko se vam pojavijo podplutbe pod očmi, blag krvavkasto sluzast izcedek ter blažja bolečina, ki preneha v nekaj dneh.

MOŽNI ZAPLETI:

- krvavitev,
- moten odtok solz,
- oteklina okoli očesa (vnetje, nabiranje krvi ali zraka),
- motnje vida in/ali slepota,
- poškodbe lobanjskega dna,
- pooperacijske brazgotine v nosu in obnosnih votlinah,
- okvara voha,
- vztrajanje težav,
- zapleti v povezavi z anestezijo.

Dejavniki, ki lahko povečajo možnost zapletov, so:

- motnje strjevanja krvi,
- pridružene bolezni (npr. bolezni srca, sladkorna bolezen, ...),
- kajenje, uporaba kokaina,
- predhodna operacija nosu,
- aspirinska intoleranca.

PO OPERACIJI

Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo:

- ne izpihavajte nosu,
- prvih nekaj dni ležite s privzdignjenim vzglavjem,
- na nos si dajajte hladne obkladke, da zmanjšate bolečino in otekanje,
- ne uporabljajte aspirina za lajšanje bolečin,
- nosnici redno čistite, izpirajte s fiziološko raztopino,
- ne kadite.

Po odpustu iz bolnišnice poiščite zdravniško pomoč v naslednjih primerih:

- krvavitev, ki ne preneha v 15 minutah,
- motnje vida ali otekanje okoli oči,
- rdečina, oteklina, močna bolečina, gnojen izcedek iz nosu,
- znaki vnetja vključno z vročino in mrzlico,
- motnje dihanja.

Oddelek za Otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Kataloška oznaka:KOLo-11

Januar 2014