

Operacija ušesa

Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPERACIJA

Je poseg, pri katerem z mikroskopom pregledamo srednje uho in se glede na lokalno stanje odločimo za odstranitev bolezenske okvare, obnovo bobniča in/ali slušne verige. Namen vseh posegov ni izboljšanje sluha, temveč marsikdaj le odstranitev bolezenske okvare.

- Timpanoskopija – pregled srednjega ušesa z mikroskopom
- Miringoplastika – obnova predrtega bobniča
- Timpanoplastika z osikuloplastiko – obnova predrtega bobniča in slušne verige
- Timpanoplastika z mastoidektomijo – obnova predrtega bobniča in odstranitev vnetnega procesa v bradavičniku (mastoidu)
- Stapedotomija – kirurška odstranitev stremenca ter obnova slušne verige s protezo

Poseg poteka v splošni anesteziji. Operacijski pristop do srednjega ušesa napravimo z rezom za uhljem ali skozi sluhovod. Po posegu rano zašijemo, sluhovod zatamponiramo in uho povijemo.

MOŽNI ZAPLETI:

- vnetje z možnostjo prodora v globlja tkiva,
- poslabšanje sluha,
- poškodba obraznega živca z moteno gibljivostjo polovice obraza in/ali motnjo okusa,
- vrtoglavica,
- zvonjenje v ušesu,
- slabo celjenje,
- splošni zapleti anestezije.

PO OPERACIJI

Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo, da se izogibate:

- izpihovanju nosu in kihanju,
- močenju ušesa,
- hitrim spremembam zračnega tlaka (letenje z letalom, potapljanje,...),
- dvigovanju težkih bremen.

Do popolnega okrevanja lahko mine nekaj mesecev. Po posegu se lahko pojavita prehodna vrtoglavica in blažji izcedek iz sluhovoda. Tamponada se bo postopno odstranila v dveh do treh tednih.

Po odpustu iz bolnišnice takoj poiščite zdravniško pomoč v primeru:

- nenadnega poslabšanja ali izgube sluha,
- znakov vnetja (rdečina, oteklina, močnejša bolečina, vročina ali mrzlica),
- močnejšega ali smrdljivega izcedka iz sluhovoda,
- krvavitve, iztoka iz incizijske rane,
- hujše vrtoglavice.

Oddelek za Otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Kataloška oznaka: KOLo-13

Januar 2014