

TONZILEKTOMIJA

Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPERACIJA

Tonzilektomija je kirurška odstranitev tonzil (mandljev). Tonzili sta skupek limfatičnega tkiva na obeh straneh žrela.

Najpogostejši razlogi za odstranitev tonzil so:

- kronična ali ponavljajoča se vnetja tonzil (angine),
- ponavljajoči se peritonzilarni ognjki,
- povečani tonzili z motnjami dihanja,
- povečani tonzili z motnjami prehranjevanja in posledičnim zaostankom v rasti.

Opustitev predlaganega posega lahko vodi v poslabšanje težav, ki so vas privedle do obiska pri zdravniku ter možnosti dodatnih škodljivih učinkov na zdravje.

Tonzilektomijo do 18. leta starosti opravljamo v splošni anesteziji, po 18. letu starosti pa praviloma v potencirani lokalni anesteziji.

MOŽNI ZAPLETI

Zapleti pri tonzilektomiji so redki, glavni so:

- krvavitev (lahko tudi do 7 ali več dni po posegu),
- prehodne težave pri dihanju,
- težave pri požiranju,
- vnetje,
- sprememba glasu,
- bruhanje,
- zapleti v povezavi z anestezijo.

Motnje strjevanja krvi lahko povečajo možnost zapletov.

PO OPERACIJI

Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo nekaj dni obroke mehkejše hrane ter izogibanje vročim napitkom. Starši ob odpustu prejmejo tudi pisna navodila.

Po zapustitvi bolnišnice takoj poiščite zdravniško pomoč v primeru:

- krvavitve,
- oteženega dihanja,
- vnetja,
- močne bolečine.

Oddelek za Otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Kataloška oznaka: KOLo-06

November 2013