

## MOŽNI ZAPLETI

Noben zdravnik ne more vnaprej zagotoviti uspeha in popolne varnosti operacije.


Splošne nevarnosti operacij, kot so okužbe, tromboze (tvorba krvnih strdkov) ali dodatne poškodbe, so zaradi napredka v medicini postale redke in tudi zdravljenje zapletov je bistveno uspešnejše.

Odstranitev polipov na danki z instrumentom, vstavljenim skozi zadnjično odprtino, praviloma poteka brez zapletov, izjemoma pride do poškodbe stene črevesa ali do močnejše krvavitve, kar lahko zahteva operacijo.

Pri operaciji črevesa lahko zaradi slabega tesnjenja šivov pride do vnetja trebušne mrene, abscesa ali krvavitve. Posegi na danki lahko vplivajo na potenco. Včasih pride do motenj v delovanju mišic zapiralk mehurja ali črevesa.

## MOŽNOSTI ZA USPEŠNOST ZDRAVLJENJA

Skoraj vedno so izgledi za ozdravitev dobri ali zelo dobri. To velja tudi v primeru zločestega polipa v začetni fazi.



## O OPERACIJAH PRI POLIPIH DEBELEGA ČREVESA

---

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo  
Avtorja: Matej Štante, dr. med. in  
Matej Podgoršek, dr. med.  
Kataloška oznaka:KVo-03

# polipi debelega črevesa

## Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.


Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

## BOLEZEN IN MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA

Pri polipih gre za izbokline sluznice na enem ali več mestih. So polipi, ki ne povzročajo težav, drugi povzročajo krvavitev, zelo veliki lahko celo zaprejo črevo, nekateri pa se nagibajo k zločesti rasti (rak debelega črevesa). Posebno velika je nevarnost pri podedovanih, tako imenovanih družinskih polipih. Zdravljenje z dieto ali zdravili ni možno. Z operacijo se boste izognili težavam, ki bi sčasoma nastale, in nevarnosti nastanka raka debelega črevesa.

## IZVEDBA OPERACIJE

Poseg je odvisen od lege, velikosti in števila polipov, lahko pa se med operacijo izkaže, da ga je nujno razširiti. Polipi v danki so lahko dostopni in jih večinoma odstranimo z instrumentom, ki ga uvedemo skozi zadnjično odprtino.



Polipe, za katere domnevamo, da bi lahko bili zločesti, je treba odstraniti v celoti, z varnostnim robom v zdravo tkivo. Zato je praviloma treba črevo odpreti, odstraniti oboleli del in sešiti oba konca črevesa.

Pri družinski polipozi, pri kateri je vsa sluznica debelega črevesa posejana s polipi, je velika nevarnost razvoja raka na debelem črevesu. Včasih je treba odstraniti celotno debelo črevo, danko in zadnjično odprtino, tanko črevo pa izpeljemo v umetni izhod (stoma) v trebušni steni. V nekaterih primerih lahko ohranimo mišico zapiralko ali celo danko in tanko črevo izpeljemo v izhod na normalnem mestu. Posamezne polipe, ki še ostanejo, moramo kasneje odstranjevati endoskopsko.

Sodobni pripomočki omogočajo ljudem s stomo življenje brez posebnih težav, ne da bi okolica karkoli opazila.