

Navodilo za paciente, ki jemljejo zdravilo**ELIQUIS**

Zdravnik vam je predpisal antikoagulacijsko zdravilo Eliquis®(apixaban), s katerim preprečujemo nastanek možganske kapi.

Da bo zdravljenje varno in uspešno, morate upoštevati spodnja navodila:

JEMANJE ZDRAVILA

- Zdravilo jemljite **REDNO** po navodilih vašega zdravnika, **zjutraj in zvečer ob istem času**.
- Tableto pogoltnite skupaj z vodo. Zdravilo Eliquis® lahko jemljete skupaj s hrano ali brez nje.
- **Če pozabite vzeti odmerek zdravila Eliquis®**, ga morate vzeti takoj, ko se spomnite, nato pa nadaljevati jemanje dvakrat na dan kot pred tem.
- **Nikoli ne prenehajte jemati zdravila, ne da bi se pred tem posvetovali z vašim zdravnikom v antikoagulacijski ambulati.**

PRIPRAVA NA POSEG

- Zdravnika, ki bo poseg opravil, morate opozoriti, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo (pokažite mu izvid zdravljenja) ter si zagotovite datum posega.
- Pred vsakim kirurškim ali drugim invazivnim posegom pridite k svojemu zdravniku v antikoagulacijsko ambulanto **vsaj pet dni pred načrtovanim datumom posega**, da vas bo zdravnik nanj ustrezno pripravil. Upoštevajte navodila, ki jih dobite v svoji antikoagulacijski ambulanti.

ČE SE POJAVI KRVAVITEV

- V primeru krvavitve se vedno posvetujte z zdravnikom, preden prekinete jemati zdravilo.
- **Majhne krvavitve** (iz nosu, v očesno veznico, iz dlesni, v kožo, podkožje in mišičje): poskušajte zaustaviti krvavitve navzven – pritisk na rano, hladni obkladki, nato čim prej pridite ali pokličite v

svojo antikoagulacijsko ambulanto.

- **Velike krvavitve** (iz prebavil, sečil, rodil, v možgane): potreben je **TAKOJŠNJI** pregled pri osebnem zdravniku oziroma v urgentni službi. KASNEJE lahko antikoagulacijsko ambulanto obvestite o krvavitvi ali pa to storijo vaši svojci.
- Če med zdravljenjem padete ali se poškodujete, zlasti če se udarite v glavo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

POMEMBNO JE TUDI

- da svojega zdravnika v antikoagulacijski ambulanti obvestite o vseh zdravilih, ki jih trenutno jemljete, ter mu poveste, če kakšno zdravilo jemljete na novo, tudi zdravila, ki jih lahko kjerkoli kupite brez recepta;
- da vedno obvestite svojega zdravnika, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo;
- **v primeru bolezni** (bruhanje ali driska, ki vodi v izsušitev, okvara v delovanju ledvic, okvara v delovanju jeter, poslabšanje srčnega popuščanja) je pomembno, da **TAKOJ** pridete v vašo antikoagulacijsko ambulanto na predčasni pregled.

Priporočamo vam, da ta navodila shranite, da vam bodo dosegljiva vedno, ko se boste znašli v dvomih, kako ravnati v opisanih situacijah.

Kardiološki oddelek
Telefon: 03 423 35 73
Kataloška oznaka: IKF-09