

Navodilo za paciente, ki jemljejo zdravilo

PRADAXA

Zdravnik vam je predpisal antikoagulacijsko zdravilo Pradaxa[®] (dabigatran eteksilat), s katerim preprečujete nastanek možganske kapi.

Da bo zdravljenje varno in uspešno, morate slediti spodnjim navodilom:

JEMANJE ZDRAVILA

- Zdravilo jemljite **REDNO** po navodilih vašega zdravnika, **zjutraj in zvečer ob istem času**.
- Zdravilo lahko jemljete s hrano ali brez. Celo kapsulo pogoltnite z malo vode.
- Če se vam pojavijo želodčne težave, vzemite zdravilo s hrano.
- Kapsule ne žvečite, ne lomite, niti je ne odpirajte.
- **Če zdravilo pozabite vzeti ob predvideni uri**, ga lahko še vzamete le, če je do naslednjega odmerka več kot 6 ur. Če je do naslednjega odmerka manj kot 6 ur, počakajte na naslednji odmerek – 1 kapsula.
- **Nikoli ne prenehajte jemati zdravila, ne da bi se pred tem posvetovali z vašim zdravnikom v antikoagulacijski ambulanti.**

PRIPRAVA NA POSEG

- Zdravnika, ki bo poseg opravil, morate opozoriti, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo (pokažite mu izvid zdravljenja) ter si zagotovite datum posega.
- Pred vsakim kirurškim ali drugim invazivnim posegom pridite k svojemu zdravniku v antikoagulacijski ambulanti **vsaj 5 dni pred načrtovanim datumom posega**, da vas bo lahko zdravnik nanj ustrezno pripravil.
- Sledite navodilom, ki jih dobite v svoji antikoagulacijski ambulanti.

ČE SE POJAVI KRVAVITEV

- V primeru krvavitve se vedno posvetujte s svojim zdravnikom, preden prekinete zdravljenje z zdravilom.
- **Majhne krvavitve** (iz nosu, v očesno veznico, iz dlesni, v kožo, podkožje in mišičje): poskušajte zaustaviti krvavitev navzven – pritisk na rano, hladni obkladki, nato čim prej pridite ali pokličite v svojo antikoagulacijsko ambulanto.

- **Velike krvavitve** (iz prebavil, iz sečil, iz rodil, v možgane): potreben je **TAKOJŠNJI** pregled pri osebnem zdravniku oziroma v urgentni službi. KASNEJE lahko sami ali vaši svojci obvestijo antikoagulacijsko ambulanto o krvavitvi.
- Če med zdravljenjem padete ali se poškodujete, zlasti če se udarite v glavo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

POMEMBNO JE TUDI

- da svojega zdravnika v antikoagulacijski ambulanti obvestite o vseh zdravilih, ki jih trenutno jemljete, ter mu poveste, če kakšno zdravilo jemljete na novo, tudi zdravila, ki jih lahko kjerkoli kupite brez recepta;
- vedno obvestite kateregakoli zdravnika, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo;
- **v primeru bolezni** (bruhanje ali driska, ki lahko vodita v izsušitev, okvara v delovanju ledvic, okvara v delovanju jeter, poslabšanje srčnega popuščanja) je pomembno, da **TAKOJ** pridete v vašo antikoagulacijsko ambulanto na predčasni pregled.

Priporočamo vam, da ta navodila shranite, da vam bodo dosegljiva vedno, ko se boste znašli v dvomih, kako ravnati v opisanih situacijah.

Kardiološki oddelek
Telefon: 03 423 35 73
Kataloška oznaka: IKF-07