

Navodilo za paciente, ki jemljejo zdravilo ROTEAS®

Zdravnik vam je predpisal antikoagulacijsko zdravilo Roteas® (edoksaban), s katerim preprečujemo nastanek možganske kapi ali zdravimo vensko trombozo in pljučno embolijo.

Da bo zdravljenje varno in uspešno, morate slediti spodnjim navodilom.

JEMANJE ZDRAVILA

- Zdravilo jemljite **REDNO** po navodilih vašega zdravnika, **vsak dan ob istem času**.
- Zdravilo jemljite s hrano ali brez nje.
- Če ne morete pogoltniti celih tablet, je tablete zdravila Roteas® mogoče zdrobiti in zmešati z vodo ali jabolčno čežano ter jih takoj zaužiti.
- Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Roteas®, ga vzamite takoj, ko se spomnite. Naslednji dan nadaljujete kot običajno. V istem dnevu ne smete dvakrat vzeti predpisanega odmerka.
- Če niste prepričani, ali ste zdravilo vzeli, ne jemljite dodatnih odmerkov. Na izvid zabeležite, kdaj zdravila niste vzeli.

Nikoli ne prenehajte jemati zdravila, ne da bi se pred tem posvetovali z vašim zdravnikom v antikoagulacijski ambulanti.

VPLIV DRUGIH ZDRAVIL

Na delovanje zdravila Roteas® vpliva zelo malo zdravil. Ob zdravljenju z zdravilom Roteas® ne priporočamo:

- zdravil proti bolečinam (npr. Ketonal®, Voltaren®, Ibubel®, Nalgesin forte®)
- antiagregacijskih zdravil (acetilsalicilna kislina/Aspirin®, klopidoogrel).

PRIPRAVA NA POSEG

- Zdravnika, ki bo poseg opravil, morate opozoriti, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo (pokažite mu izvid zdravljenja) ter si zagotovite datum posega.
- Pred vsakim kirurškim ali drugim invazivnim posegom pridite k svojemu zdravniku v antikoagulacijsko ambulanto **vsaj 5 dni pred načrtovanim datumom posega**, da vas bo lahko nanj ustrezno pripravil. Upoštevajte navodila, ki jih dobite v svoji antikoagulacijski ambulanti.

ČE SE POJAVI KRVAVITEV

- V primeru krvavitve se vedno posvetujte s svojim zdravnikom, preden prekinete zdravljenje s tem zdravilom.



- **Majhne krvavitve** (iz nosu, v očesno veznico, iz dlesni, v kožo, podkožje in mišičje): poskušajte zaustaviti krvavitev navzven – pritisk na rano, hladni obkladki, nato čim prej pridite ali pokličite v svojo antikoagulacijsko ambulantno.
- **Velike krvavitve** (iz prebavil, sečil, rodil, v možgane): potreben je **TAKOJŠNJI** pregled pri osebnem zdravniku oziroma v **urgentni službi**. KASNEJE lahko sami ali vaši svojci obvestijo antikoagulacijsko ambulantno o krvavitvi.

POMEMBNO JE TUDI

- da svojega zdravnika v antikoagulacijski ambulanti obvestite o vseh zdravilih, ki jih trenutno jemljete, ter mu poveste, če kakšno zdravilo jemljete na novo, tudi zdravila, ki jih lahko kjerkoli kupite brez recepta;
- da vedno obvestite kateregakoli zdravnika, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo;
- **v primeru bolezni** (bruhanje ali driska, ki lahko vodita v izsušitev, okvara v delovanju ledvic, okvara v delovanju jeter, poslabšanje srčnega popuščanja) je pomembo, da **TAKOJ** pridete v vašo antikoagulacijsko ambulantno na predčasni pregled.

Priporočamo vam, da ta navodila shranite, da vam bodo dosegljiva vedno, ko se boste znašli v dvomih, kako ravnati v opisanih situacijah.

Telefon: 03 423 35 73

Kardiološki oddelek
Kataloška oznaka: IKF-10
Januar 2024, verzija 1