

Navodilo za paciente, ki jemljejo zdravilo

XARELTO

Zdravnik vam je predpisal antikoagulacijsko zdravilo Xarelto[®] (rivaroksaban), s katerim preprečujemo nastanek možganske kapi ali zdravimo globoko vensko trombozo in pljučno embolijo.

Da bo zdravljenje varno in uspešno, morate slediti spodnjim navodilom:

JEMANJE ZDRAVILA

- Zdravilo jemljite **REDNO** po navodilih vašega zdravnika, **vsak dan ob istem času**.
- Zdravilo je treba jemati s hrano.
- Če ste pozabili vzeti zdravilo Xarelto:

☐ **Zdravilo jemljete zaradi nerednega srčnega utripa (atrijske fibrilacije)**

Če ste pozabili vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite.

Ne vzemite več kot ene tablete v enem dnevu, da bi s tem nadomestili pozabljeni odmerek.

Naslednjo tableto vzemite naslednji dan, potem pa nadaljujte jemanje ob običajni uri.

☐ **Zdravilo jemljete zaradi globoke venske tromboze ali pljučne embolije**

Če ste pozabili vzeti odmerek (tableto) v času, ko jemljete po 15 mg dvakrat na dan, jo vzemite takoj, ko se spomnite.

V prvih 3 tednih zdravljenja lahko vzamete dve tableti po 15 mg hkrati, to je skupaj dve tableti (30 mg) na dan.

Naslednji dan nadaljujte jemanje ene tablete po 15 mg dvakrat na dan.

Ne vzemite več kot dveh tablet po 15 mg v enem dnevu.

- Nikoli ne prenehajte jemati zdravila, ne da bi se pred tem posvetovali z vašim zdravnikom v antikoagulacijski ambulanti.

PRIPRAVA NA POSEG

- Zdravnika, ki bo poseg opravil, morate opozoriti, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo (pokažite mu izvid zdravljenja) ter si zagotovite datum posega.
- Pred vsakim kirurškim ali drugim invazivnim posegom pridite k svojemu zdravniku v antikoagulacijsko ambulantno **vsaj 5 dni pred načrtovanim datumom posega**, da vas bo lahko zdravnik nanj ustrezno pripravil. Sledite navodilom, ki jih dobite v svoji antikoagulacijski ambulanti.

ČE SE POJAVI KRVAVITEV

- V primeru krvavitve se vedno posvetujte z zdravnikom, preden prekinete zdravljenje z zdravilom.
- **Majhne krvavitve** (iz nosu, v očesno veznico, iz dlesni, v kožo, podkožje in mišičje): poskušajte zaustaviti krvavitev navzven – pritisk na rano, hladni obkladki, nato čim prej pridite ali pokličite v svojo antikoagulacijsko ambulantno.
- **Velike krvavitve** (iz prebavil, iz sečil, iz rodil, v možgane): potreben je **TAKOJŠNJI** pregled pri osebem zdravniku oziroma v urgentni službi. KASNEJE lahko sami ali vaši svojci obvestijo antikoagulacijsko ambulantno o krvavitvi.
- Če med zdravljenjem padete ali se poškodujete, zlasti če se udarite v glavo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

POMEMBNO JE TUDI

- da svojega zdravnika v antikoagulacijski ambulanti obvestite o vseh zdravilih, ki jih trenutno jemljete, ter mu poveste, če kakšno zdravilo jemljete na novo, tudi zdravila, ki jih lahko kjerkoli kupite brez recepta;
- da vedno obvestite vsakega zdravnika, da jemljete antikoagulacijsko zdravilo;
- **v primeru bolezni** (bruhanje ali driska, ki lahko vodita v izsušitev, okvara v delovanju ledvic, okvara v delovanju jeter, poslabšanje srčnega popuščanja) je pomembno, da **TAKOJ** pridete v vašo antikoagulacijsko ambulantno na predčasni pregled.

Priporočamo vam, da ta navodila shranite, da vam bodo dosegljiva vedno, ko se boste znašli v dvomih, kako ravnati v opisanih situacijah.

Kardiološki oddelek
Telefon: 03 423 35 73
Kataloška oznaka: IKF-06