APIKOTOMIJA

Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlaganega zdravljenja.

APIKOTOMIJA

Apikotomija je kirurški poseg, pri katerem odstranimo vrh zobne korenine (apeks) in omogočimo ohranitev vnetega zoba. Največkrat apikotomijo opravimo po endodontskem zdravljenju, ko v korenini zoba še vedno ostanejo bakterije, ki ustvarijo cisto ali granulom.

OPIS POSTOPKA

Po lokalni anesteziji naredimo rez na ustni sluznici in jo odluščimo od kostne podlage. Ob vodnem hlajenju s svedrom odbrusimo kost nad spremembo, nato pa odstranimo koreninski vršek obolelega zoba skupaj s pripadajočim vnetnim tkivom. Med posegom ocenimo ustreznost polnitve koreninskega kanala in jo po potrebi dopolnimo ter zatesnimo. Rano zapremo s kirurškimi šivi, ki jih odstranimo čez teden dni.

MOŽNI ZAPLETI

Kot pri vsakem kirurškem posegu tudi pri apikotomiji ni mogoče s popolno gotovostjo izključiti zapletov. Možno je vnetje rane, kar podaljša čas celjenja, a običajno nima trajnejših posledic. Močnejša krvavitev po posegu je redka in obvladljiva z enostavnimi postopki.
Pri posegu v področju zgornje čeljusti lahko pride do odprtja nosne ali čeljustne votline (sinusa), praviloma pa v tem primeru pride do spontane in normalne zacelitve rane.
Pri posegu na zadnjih zobeh spodnje čeljusti lahko pride de poškodbe v neposredni bližini ležečega živca, kar lahko povzroči prehodno ali v redkih primerih trajno motnjo občutka ali mravljinčenje v delu spodnje ustnice.

NAVODILA IN NEGA PO POSEGU

Na dan operacije in še dva dni po njej: ne kadite, ne uživajte alkohola, izogibajte se telesnim naporom, jejte mehko (pasirano) hrano. V rano ne drezajte. **Zobe si lahko umivate, vendar ne v področju rane.** Na ustnico ali lice v operiranem področju položite hladen obkladek. S tem boste močno zmanjšali otekanje in bolečino. Ne ogrevajte prizadetega predella, sajlahko povzročite povečanje otekline!
V primeru krvavitve v prvih urah po operaciji rane NE sesajte z jezikom! Nalahno pritisnite na krvaveče mesto s sterilno gazo.
Občutek omrtvičenosti zaradi delovanja lokalnega anestetika ponavadi traja še dve do največ šest ur po posegu. Ne grizite si ustnic ali sluznice lica, saj se lahko nehote poškodujete.

ČE SE POJAVIJO NASLEDNJE TEŽAVE:

- močnejša krvavitev,
- povišana telesna temperatura nad 38 °C,
- naraščajoča oteklina, ki ne mine po treh dneh,
- otežkočeno odpiranje ust ali požiranje sline,
- kljuvajoče bolečine, ki trajajo več kot tri dni

se po predhodnem telefonskem pogovoru oglasite v naši ambulanti.

Kontaktna telefonska številka v primeru zapletov je **(03) 423 33 77.** Nanjo smo dosegljivi v **ponedeljek med 11.30 in 13.30**, **v torek, sredo, četrtek in petek pa med 8.00 in 10.00** ali preko e-pošte: **mafa@sb-celje.si.**

Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Kataloška oznaka: KČa-02
Januar 2024, verzija 3