

FRAKCIONIRANA ABRAZIJA («ČIŠČENJE»)


Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPIS POSEGA

Frakcionirana abrazija je operativni poseg, potreben bodisi zaradi nepravilne krvavitve iz maternice, ugotovljenih patoloških sprememb v brisu, ali kadar pri ultrazvočnem pregledu domnevamo, da gre za bolezensko spremembo v maternici. Tkivo, dobljeno z abrazijo, nato pošljemo na histopatološko preiskavo. Glede na rezultat preiskave se zdravnik odloči, kakšno bo nadaljnje zdravljenje, če bo potrebno.



Operativni poseg opravimo v splošni anesteziji in praviloma traja 10 do 15 minut. Pri posegu kirurg najprej s posebnim instrumentom (kireto) postrga sluznico materničnega vratu, nato z dilatatorji razširi cervikalni kanal, da lahko z večjo kireto postrga še sluznico iz telesa maternice. Dobljeno tkivo sluznic ločeno pošlje na histopatološko preiskavo (patolog pregleda celice pod mikroskopom).

ZAPLETI (neželene, nenačrtovani dogodki med operacijo in po njej):

Pri frakcionirani abraziji so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem **vnetje, krvavitev ali poškodba (predrtje) maternice**.

Vnetje — je posledica vdora bakterij v operacijsko rano, lahko med operacijo ali po njej. Bolečina se stopnjuje, pojavita se lahko povišana temperatura in gnojen, smrdeč izcedek. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki. Pri hudih vnetjih je včasih potreben dodaten operativni poseg z odprtjem trebuha in odstranitvijo rodil.

Krvavitev — praviloma traja do 7 dni in ne sme biti močnejša od mesečnega perila. Krvavitev, ki nastane zaradi posega samega, zaustavimo z zdravili. Pri hudih krvavitvah je včasih potreben dodaten operativni poseg z odprtjem trebušne votline in odstranitvijo rodil.

Poškodba (predrtje) maternice — če pride do poškodbe maternice med samim posegom, sta potrebni podaljšana antibiotska zaščita in podaljšana hospitalizacija za 24 ur. V primeru večjega defekta v steni maternice pa je potrebna laparoskopjska operacija — to pomeni, da moramo skozi rez pod popkom s kamero pogledati v trebuh in zašiti poškodovano steno maternice. Pri hudi poškodbi maternice lahko pride do dodatnih zapletov s poškodbo sosednjih organov, hudo krvavitvijo in/ali vnetjem.

Zapleti pri operativnih posegih so redki

Zaplete pri operativnem posegu učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je okrevanje daljše in zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake možnih zapletov, pomoč poiščite pri izbranem ginekologu ali na Ginekološko-porodniškem oddelku na telefonski številki 03 423 33 42 ali 03 423 33 45.

Ginekološko-porodniški oddelek

Kataloška oznaka: GPGO-12

December 2017, verzija 1