

IZREZ DELA MATERNIČNEGA VRATU Z ELEKTRIČNO ZANKO (LLETZ)

Spoštovani!


Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPIS BOLEZNI IN POSEGA

Zaradi patoloških sprememb v brisu oz. histološko potrjenih predrakavih sprememb na vašem materničnem vratu, je treba izrezati del tkiva materničnega vratu, da spremenjene celice v celoti odstranimo.

Operativni poseg lahko opravimo v splošni ali lokalni anesteziji in praviloma traja 15 minut. Pri posegu kirurg z električno



zanko odreže tisti del materničnega vratu, kjer se s posebnim barvanjem prikažejo spremenjene celice. Velikost zanke je odvisna od obsega spremembe. Odstranjeno tkivo pošljemo na histopatološko preiskavo (patolog pregleda celice pod mikroskopom). Na področju odstranjenega tkiva je na koncu treba zaustaviti krvavitev — kirurg krvaveči predel požge z električnim inštrumentom. Še nekaj dni po posegu se lahko pojavlja krvavkast izcedek. Zaradi narave posega obstaja možnost, da **robovi tkiva niso izrezani v zdravo**, zato ga je včasih treba ponoviti — reLLETZ.

ZAPLETI (neželene, nenačrtovani dogodki med operacijo in po njej):

Pri **operativnem posegu LLETZ** so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem **vnetje, krvavitev in poškodba sosednjih organov**.

Vnetje — je posledica vdora bakterij v operacijsko rano, lahko med operacijo ali po njej. Rana postane rdeča, bolečina se stopnjuje, pojavita se lahko povišana temperatura in gnojen, smrdeč izcedek. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki.

Krvavitev — praviloma traja do 7 dni in ne sme biti močnejša od mesečnega perila. Zaustavimo jo tako, da področje, ki krvavi, ponovno požgemo z električnim inštrumentom ali na krvavečo žilo nastavimo šivo ali vstavimo tamponado (trak v nožnico).

Poškodba sosednjih organov je izjemno redka. Potreben je dodaten kirurški poseg, glede na naravo poškodbe lahko tudi odprtje trebušne votline in ustrezna oskrba zapleta.

Zaplete pri operacijah učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je okrevanje daljše in zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake možnih zapletov, pomoč poiščite pri izbranem ginekologu ali na Ginekološko-porodniškem oddelku na telefonski številki 03 423 33 42 ali 03 423 33 45.

Ginekološko-porodniški oddelek
Kataloška oznaka:GPGO-01
 December 2017, verzija 1