

 Splošna bolnišnica Celje Oddelek za laboratorijsko medicino		NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNI ODTIS (ANUS NA PODANČICE)	Oznaka dokumenta: LAB SOP 311 ND01
Verzija: 003	Veljavnost od: 19.01.2016		Stran od strani: 1 od 1

Perianalni odtis je **namenjen dokazovanju jajčec podančice** (*Enterobius vermicularis*), saj se jajčeca pri tem zajedavcu ne izločajo z blatom. Samica parazita leže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, običajno ponoči. Jajčeca se prilepijo na kožo okoli zadnjika. Dokažemo jih s pomočjo perianalnega odtisa.

Navodilo za odvzem perianalnega odtisa:

- Zvečer zadnjico umijete in **ne** namažete s kremo.
 - **Odtis odzemetite zjutraj pred uriniranjem in iztrebljanjem brez predhodnega umivanja.**
 - V laboratoriju predhodno dobite objektno stekelce, prelepljeno z lepilnim trakom. Z roko odlepate lepilni trak in ga previdno pritisnete z lepljivo površino na kožo okoli zadnjika. Pri tem si lahko pomagate z žličko ali orokavičenim prstom.
 - Lepilni trak previdno prilepite nazaj na stekelce tako, da med površino predmetnega stekelca in lepilnega traku ni mehurčkov zraka. Pri pravilnem odvzemu boste na stekelcu videli odtis anusa v obliki rozete.
 - Paziti morate, da se stekelce ne razbije ali lepilni trak ne zmečka.
- **Stekelce z odtisom čim prej prinesite v Urinski laboratorij (delovni čas: od ponedeljka do petka, 7.-15. ure, telefonska številka: 03 423 3650).**
 - Vsaj 1 teden pred zbiranjem in v času zbiranja vzorcev blata ne smete uživati odvajal ali sredstev proti driski, antibiotikov in antimalarikov ter preparatov, ki vsebujejo bizmut, barij ali antacide.