

NAVODILA ZA UPORABO KAPLJIC ATROPIN**Spoštovani!**

Kapljice niso predpisane kot zdravilo, ampak le kot priprava za pregled.

Kapljice očem samim niso škodljive. Razširijo zenici in ohromijo prilagodljivost oči za gledanje na bližino. Otroku se bo po teh kapljicah nekaj dni bleščalo na močnejši svetlobi in ne bo dobro videl na bližino, kar morate upoštevati pri otroku, ki obiskuje šolo. V tem času naj uporablja zaščito pred sončno svetlobo.

Možna je alergija na atropin, zato bodite takrat pozorni na povišano telesno temperaturo, pordelost veznice, močno pordelo kožo okrog oči in obraza, slabost, bruhanje. V takem primeru takoj prenehajte dajati kapljice in otroka peljite k njegovemu osebnemu zdravniku oz. pediatru. Na za to določeni datum pa pridite na pregled tudi v primeru, če je otrok imel alergijo.

Učinek kapljic bo popustil 10 do 14 dni po pregledu.

Kapljice kapajte:

Prvi dan po eno kapljico v vsako oko zjutraj in zvečer

Drugi dan..... po eno kapljico v vsako oko zjutraj in zvečer

Tretji dan..... po eno kapljico v vsako oko zjutraj in zvečer

Četrty dan..... še zjutraj po eno kapljico, nato pripeljite otroka v ambulantno.

Pri manjšem otroku kapanje najlažje izvedete tako, da ga položite, mu pridržite glavo in razprete veke. Nato kanete po eno kapljico v vsako oko.

Če imate vprašanja, povezana z naročeno preiskavo, se lahko **po telefonu (03 423 33 29)** pogovorite z medicinsko sestro od ponedeljka do petka **med 8. in 12. uro**.

Očesni oddelek
Kataloška oznaka: KOČa-04
Junij 2023, verzija 1