

APLIKACIJA SKLEPNE BLOKADE ALI BLOKADE BOLEČIH TOČK Z ANESTETIKOM IN STEROIDOM

Spoštovani!

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlaganega posega. Razlaga je informativne narave in nima pravnih posledic, je zgolj osnova za vaše razumevanje zdravljenja in temelj dobrega sodelovanja med pacientom in osebjem ortopedskega oddelka.

OPIS ZDRAVLJENJA

Dobili boste injekcijo zdravila. Prosimo, da po aplikaciji v čakalnici počakate še 15 minut.

Blokada je kirurški poseg, pri katerem v sterilnih razmerah apliciramo zdravilo v sklep, mišico ali tetivo.

Največkrat se odločimo za aplikacijo lokalnega anestetika, ki deluje protibolečinsko, in kortikosteroida, ki ima močan protivnetni učinek. Do polnega učinka zdravila po navadi traja tri do štiri dni.

Najpogostejše indikacije za blokado so osteoartraza, revmatične bolezni, burzitis, tenosinovitis, epikondilitis itd.

MOŽNI ZAPLETI

Strokovno opravljena aplikacija zdravila je običajno varen poseg, kljub temu pa lahko v določenih primerih pride do neželenih dogodkov in zapletov, ki so na srečo redki. Pomembno je, da jih razumete.

- Injiciranje zdravila je minimalno boleč postopek. Pri posameznikih lahko kljub temu pride do prehodne slabosti, vrtoglavice ali v skrajnem primeru celo do izgube zavesti.
- Med posegom ali po njem lahko pride do krvavitve, poškodb žil, živcev, tetiv ali mišic.
- Področje injiciranja je lahko boleče. Nelagodni občutki po navadi v nekaj dneh izginejo.
- Nekateri bolniki v dneh po posegu lahko občutijo žarenje obraza.
- Lahko se pojavi prehodna rdečina kože, zelo redko tudi bledica ter stanjšanje kože in podkožja.
- Možno je bakterijsko vnetje v področju injiciranja. Če se pojavi rdečina, oteklina, povišana telesna temperatura, je potreben takojšen zdravniški pregled.
- Lahko pride do sistemske preobčutljivostne reakcije na zdravila, od blage rdečine, srbečice, izpuščajev do anafilaktičnega šoka.
- V dneh po posegu se vrednost krvnega sladkorja pri diabetikih poslabša.
- Bolnice lahko zaznajo prehodne motnje v menstrualnem ciklusu. V teh primerih se posvetujte z ginekologom.

OPOZORILA

- Če jemljete zdravila proti strjevanju krvi (Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, Marevan®,), potem morate to zdravilo dva dni pred injekcijo zamenjati z drugim, ki naj vam ga predpiše izbrani zdravnik ali specialist v antikoagulantni ambulanti.
- Bolniki s sladkorno boleznijo morate po injekciji še dodatno kontrolirati koncentracijo sladkorja v krvi. Prehrano in zdravila v tem primeru za nekaj dni prilagodite višjim koncentracijam sladkorja.

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Kataloška oznaka: KOa-04

Februar 2024, verzija 1